

KATANOL 96 EC

Zezwolenie PZH/HT-2688/2012

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Adiuwant-preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków przedziorkobójczych w uprawach sadowniczych.

Zawartość substancji aktywnej:
olej parafinowy mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe) – 96%

Uwaga:

1. Zabrania się stosowania preparatu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie zdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.

DZIAŁANIE PREPARATU

KATANOL 96 EC powoduje poprawę działania środka przedziorkobójczego poprzez zwiększenie przyczepności do chronionej powierzchni rośliny, zapobiega również zmywaniu preparatu przez opady i ułatwia wnikanie do rośliny, ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej, zmniejsza znoszenie preparatu na sąsiednie uprawy.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Towarzystwo Chemiczne "DANMAR",
ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź;
tel./fax: +48 42 6509550, +48 42 6506695,
e-mail: danmar@ld.onet.pl

Wyłączny dystrybutor:
Agrosimex Sp. z o.o.,
Goliary 43, 05-620 Błędnów,
tel. (48) 668 04 71, fax: (48) 668 08 35
e-mail: info@agrosimex.com.pl

Okres ważności - 2 lata

Zawartość netto:

Data produkcji:

Numer partii:



ZASTOSOWANIE

KATANOL 96 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania w sadownictwie ze środkami przedziorkobójczymi.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

KATANOL 96 EC stosować łącznie ze środkami owadobójczymi zgodnie z zaleceniami producenta.

ROŚLINY SADOWNICZE

drzewa i krzewy owocowe

- przedziorki i szpeciele

Opryskiwać od początku wegetacji do pierwszych liści, najlepiej na początku wyłęgów larw z jaj zimowych.

Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).

Uwagi:

1. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 0°C, podczas bezwietrznej i bezdeszczowej pogody.

PRZECIWWSKAZANIA

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, jakie obowiązują dla środków, z którymi stosuje się KATANOL 96 EC.

Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej, nakładania cieczy użytkowej na stychach pasów i uwrociach.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): - **nie dotyczy**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): - **nie dotyczy**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Ciecz użytkową danego środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą-instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszałem) odmierzoną ilość preparatu KATANOL 96 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości, ciągle dokładnie mieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opakowania po preparacie KATANOL 96 EC traktować jako odpady komunalne.

Opryskiwać z włączonym mieszałem.

W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchnię poprzecznie opryskiwanej.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchnię poprzecznie opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

PRZECZYSZCZANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środków ochrony roślin, z którym stosuje się preparat KATANOL 96 EC.

Chronić przed dziećmi.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie pokłknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Opróżnione opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04	Rzeszów – (17) 866-44-09
Kraków – (12) 411-99-99	Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83	Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00	Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46	Wrocław – (71) 343-30-08