

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-103/2014d z dnia 03.04.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 85/2008 z dnia 26.11.2008 r.

Posiadacz zezwolenia:

BROS Sp.j. B.P. Miranowscy, ul. Sokoła 7 lok. 6, 60-644 Poznań. Adres do korespondencji:
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel: (0-61) 826 25 12, fax: (0-61) 820 08 41,
e-mail: biuro@bros.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

SIGMA, ul. Naramowicka 194, 61-611 Poznań, tel. (61)8 220 105,
e-mail: biuro@kropp.com.pl


**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.**

SNACOL 05 GB

Zawartość substancji czynnej:

metaldehyd (2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetroksokan – związek z grupy pochodnych aldehydu) –
5 %.

**Zezwolenie MRiRW Nr R – 85 /2008 z dnia 26.11.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-237/2010d z dnia 24.08.2010 r. oraz
decyzją MRiRW nr R- 103/2014d z dnia 03.04. 2014 r.**



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

SNACOL 05 GB jest środkiem ślimakobójczym o działaniu żołądkowym i kontaktowym, w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków w niektórych roślinach rolniczych oraz roślinach ozdobnych pod osłonami. Środek wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze

1. RZEPAK OZIMY, PSZENICA OZIMA

- ślimaki (pomrowik plamisty)

Zalecana dawka: 4 kg/ha.

Stosować po siewie do fazy tworzenia się rozet rzepaku lub krzewienia się pszenicy.

W sezonie wykonać 1-3 zabiegów w odstępach 10-14 dniowych.

Środek rozsypać równomiernie na polu, na przykład aplikatorem do granulowanych środków chwastobójczych. Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.

Rośliny ozdobne (pod osłonami)

1. FUNKIA

Ślimak ogrodowy

2. AKSAMITKA

- ślimaki (ślimak ogrodowy, ślinik luzytański)

Zalecana dawka: 4 g/10 m².

Stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.

Środek rozsypywać równomiernie w międzyrzędziach i wzdłuż brzegów zagonów lub między roślinami.

Nie posypywać liści roślin uprawnych.

Nie stosować częściej niż 1-2 razy w sezonie uprawy w odstępach 5-7 dniowych.

UWAGI:

1. Środek jest odporny na zmywanie przez deszcz i podlewanie.

2. Środek nie pleśnieje zalegając na powierzchni gleby.

3. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczorem.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

Rzepak ozimy, pszenica ozima, rośliny ozdobne – NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania produktu.
 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 - Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !!!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04
Kraków – (12) 411 99 99
Lublin – (81) 740 89 83
Łódź – (42) 657 99 00
Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Tarnów – (14) 631 54 09
Warszawa – (22) 619 66 54
Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji

Zawartość netto

Nr partii