

Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.. (22) 572 35 00, fax: 0 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

KEMIRON KONCENTRAT 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

etofumesat - metanosulfonian ($\pm$)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 500 g/l (44,3%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 68/2011 z dnia 02.11.2011 r.



Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



I OPIS DZIAŁANIA

KEMIRON KONCENTRAT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w uprawie buraka cukrowego. Środek Kemiron Koncentrat 500 SC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY

KEMIRON KONCENTRAT 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach (faza liścieni). Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaniu z innymi herbicydami: Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC.

Kemiron Koncentrat 500 SC zastosowany zgodnie z zaleceniami w powyższych mieszkankach zwalcza następujące gatunki chwastów:

I. Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC (0,2 l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1,0 l/ha):

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne;

Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku;

Chwasty średniodoporne: rdest ptasi;

Chwasty odporne: perz właściwy.

II. Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 S.C. (0,2l/ha) + Kemifam Super Koncentrat 320 EC (1l/ha)+Goltix 700 SC (1l/ha):

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku ((kiełkujące z nasion w stadium liścieni), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne;

Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny;

Chwasty odporne: perz właściwy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Burak cukrowy

Środek Kemiron Koncentrat 500 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC oraz w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC stosować od 1-go do 8-go liścia właściwego buraka cukrowego na chwasty w fazie liścieni.

Maksymalna dawka środka Kemiron Koncentrat 500 SC dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka środka Kemiron Koncentrat 500 SC dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

pierwszy zabieg

Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;

drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu:

Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha;

trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu:

Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 - 8 dni.

W przypadku silnej presji ze strony chwastów w tym samosiewów rzepaku:

pierwszy zabieg

Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha;

drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po pierwszym zabiegu:

Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha;

trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5 - 8 dni po drugim zabiegu:

Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1 l/ha + Goltix 700 SC 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 5 - 8 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1. Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie wpływa ujemnie na plon.
2. Stosując środek Kemiron Koncentrat 500 SC z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.

2 NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie. Na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na głębokość, co najmniej 15cm) można uprawiać wszystkie rośliny.

- W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie burak cukrowy lub pastewny.
- W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Kemiron Koncentrat 500 SC.
- Stosując środek w mieszaniu z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.

3 PRZECIWSKAZANIA

1. Środka nie stosować:
 - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
 - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
 - na rośliny mokre,
 - na glebach przesuszonych i zbrylonych, na glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych,
 - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12° C i powyżej 20° C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
 - w okresie spodziewanych przymrozków,
 - w ilości wody większej niż 300 l/ha,
 - łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) lub siarczanu amonowego.
2. W celu ochrony pszczoł i innych owadów zapylających środka nie stosować:
 - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
 - kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
 - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaściu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka w mieszaniu z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowych tych środków.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1 OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

Nie dotyczy

2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Burak cukrowy – 90 dni

4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

7 OCHRONA ŚRODOWISKA

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Kraków – (12) 411 99 99

Lublin – (81) 740 89 83

Łódź – (42) 657 99 00

Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Tarnów – (14) 631 54 09

Warszawa – (22) 619 66 54

Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -