Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 296./2014d z dnia 20.08.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R - 86/2010 z dnia 18.11.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. (22) 395 66 60, infolinia: (22) 395 66 66, fax (22) 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl.
2. „SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002, Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, 61 812 51 13, fax.: (61) 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: (22) 731 50 86 85 84, fax: (22) 725 54 02, www.whlogistics.pl, NIP: 522-10-01-779

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BULLDOCK 025 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
beta-cyflutryna - związek z grupy pyretroidów - **25 g w 1 litrze środka**.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 86/2010 z dnia 18. 11.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-232/2011d z dnia 04.08.2011 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 280/2013d z dnia 14.11.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 296./2014d z dnia 20.08.2014 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.

I OPIS DZIAŁANIA

BULLDOCK 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima

Mszyca zbożowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Skrzypionki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od początku okresu wylęgania się larw.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.

Chowacz czterozębny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Burak cukrowy

Pchełka burakowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie

Gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.

Piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. Niższą z zalecanych dawek środka stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.

Mszyca kapuściana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Cebula

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

11. Czosnek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy kiedy wyraźnie widoczny jest drugi liść do końca fazy gdy czosnek osiąga 50% liści zgina się.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. Por

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 2 liści do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wgryzka szczypiorka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Chowacz szczypiorak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50 % typowej średnicy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3. Pomidor

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha.**

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

4. Papryka

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha.**

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha.**

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

5. Ogórek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion i owoców.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha**.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha.**

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion i owoców.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

6. Brokuł

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha.**

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

7. Kalafior

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

8. Kapusta brukselska

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

9. Kapusta włoska

Mszyca kapuściana, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha**.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha**.
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

10. Sałata

Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha**.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha.**
Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy zostaje osiągnięta typowa masa liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

11. Groch zwyczajny

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.
Termin stosowania: od fazy 5-go liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Oprzędziki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.
Termin stosowania: od końca fazy pęcznienia nasion do końca fazy rozwoju liści.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pachówka strąkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha**.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha**.
Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,2-0,4 l/ha.**
Termin stosowania: od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mszyca grochowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.
Termin stosowania: od początku fazy rozwoju pędu do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

12. Fasola

Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: **0,4 l/ha.**
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.
Termin stosowania: od fazy 5-ciu liścia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

13. Peluszka

Mszyca grochowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,3 l/ha.**
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,25-0,3 l/ha**.
Termin stosowania: od fazy 3-go liścia właściwego do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pachówka strąkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,3 l/ha**.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,25-0,3 l/ha**.

Termin stosowania: od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Oprzędziki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,3 l/ha**.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,25-0,3 l/ha**.
Termin stosowania: od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4-tego liścia właściwego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

14. Bobik

Mszyca trzmielinowo-burakowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,3 l/ha.**
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,25-0,3 l/ha.**

Termin stosowania: przed kwitnieniem po przelocie form uskrzydlonych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Oprzędziki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,25-0,3 l/ha.**

Termin stosowania: od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4 liści właściwych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Strąkowiec bobowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,3 l/ha.**
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,25-0,3 l/ha.**
Termin stosowania: opryskiwać w końcowej fazie kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni**.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

15. Len włóknisty, len oleisty.

Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: **0,3 l/ha.**

Termin stosowania: od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2**.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **7-10 dni.**
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste.

Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować gdy pęd osiągnie 50% - 60% długości.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **2.**
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: **10-14 dni.**
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średnio lub drobnokropliste.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta

Pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, kapusta głowiasta biała, cebula - nie dotyczy.

Czosnek, por, pomidor, papryka, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, kapusta włoska, ogórek, sałata, groch, fasola, peluszka, bobik, len włóknisty, len oleisty - 1 dzień.

2. Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu)

- w przypadku dawki 0,2 – 0,4 l/ha: 7 dni.
- w przypadku dawki mniejszej lub równej 0,2 l/ha: nie dotyczy.

3. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

Kalafior, kapusta włoska, ogórek, pomidor, papryka, sałata – 3 dni.
Brokuł, kapusta brukselska, burak cukrowy, cebula, fasola, groch, kapusta głowiasta biała, por, ziemniak - 7 dni.
Bobik, czosnek, peluszka – 21 dni.
Len włóknisty, len oleisty – 30 dni
Pszenica ozima, rzepak ozimy - 35 dni.

4. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

Czosnek, cebula, pomidor, papryka, ogórek, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała, sałata, groch, fasola, ogórek, por, len

włóknisty, len oleisty, pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak - nie dotyczy.

Peluszka, bobik – 21 dni.

5. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo

Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRDOWISKA

Nie zanieczyszczać wód środkiem i jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka ochrony roślin konieczne jest wyznaczenie następującej strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych:

- pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, kapusta głowiasta biała, cebula, groch, peluszka, bobik, len włóknisty, len oleisty – 5 m strefa buforowa z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%;
- czosnek, por, pomidor, papryka, ogórek, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, kapusta włoska, sałata, fasola – 20 m strefa buforowa.

W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

<u>W przypadku dawki mniejszej lub równej 0,2 l/ha</u>
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
<u>W przypadku dawki 0,2 – 0,4 l/ha</u>
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w okresie kwitnienia. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

V PIERWSZA POMOCY

Antidotum - brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 40°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - .....
Zawartość netto - .....
Nr partii - .....