

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 26 /2013d z dnia 31 .10.2013
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 107/2013 z dnia 28.06.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii. tel.:+32 (0)4 385 97 11;
fax.: +32(0)4 385 97 49, e-mail: info@agriphar.com

Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Agrosimex Sp. z o. o., Goliary 43, 05-620 Błędów, tel.: (48) 66 80 471; 66 80 481, fax: (48) 66
80 835, e-mail: info@agrosimex.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62 – 510 Konin, tel./fax. (48) 63 240 01 18, e - mail:
[biuro@pakon – konin.pl](mailto:biuro@pakon-konin.pl)

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

DICOTEX 202 SL

**Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i
nieprofesjonalnych**

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej kwasu (2,4 dichlorofenoksy)octowego (związek
z grupy fenoksykwasów) – **70 g (7,13 %) w 1 litrze środka;**

MCPA w postaci soli kwasu (4-chloro-2-metylofenoksy)octowego (związek z grupy
fenoksykwasów)– **70 g (6,98%) w 1 litrze środka;**

mekoprop-P w postaci soli kwasu (R)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowego (związek z
grupy fenoksykwasów) – **42 g (4.35%) w 1 litrze środka;**

dikamba w postaci soli kwasu 2,5 dichloro-6-metoksybenzoowego (związek z grupy
fenoksykwasów) - **20 g (2,2%) w 1 litrze środka.**

**Zezwolenie MRiRW nr R -107/2013 z dnia 28.06.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 268/2013d z dnia 31 .10.2013 r.**

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony do
powszechnego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na
trawnikach, boiskach sportowych, polach golfowych i innych rekreacyjnych obszarach
trawiastych. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po około tygodniu od zastosowania. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmacnia działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe np.: bylica pospolita, jaskier rozłogowy, konieczyna biała, mniszek lekarski, rdest ptasi, stokrotka polna, szczaw tępolistny, tasznik pospolity

Chwasty średnio wrażliwe np.: babka zwyczajna, bodziszek drobny, krwawnik pospolity

Chwasty odporne np.: bluszcz kurdybanek, podagrycznik pospolity

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Ciecz wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza, lub mechanicznie.

Po każdej przerwie, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:

Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe

1. Termin i warunki stosowania:

Środek można stosować na wieloletnie trawniki w czasie całego okresu wegetacji traw od wiosny do jesieni (od kwietnia do połowy września) w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zabieg najlepiej wykonać gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści właściwych.

Warunki sprzyjające dla wzrostu roślin: (temperatura powyżej 12°C, odpowiednia wilgotność gleby, światło słoneczne) wzmagają skuteczność działania środka.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 l/ha (odpowiednio 100 ml środka /5 l wody/100 m²).

Zalecana dawka: 10 l/ha (odpowiednio 100 ml środka /5 l wody/100 m²).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: **średniokropliste**.

UWAGI:

Stosować co najmniej 5-7 dni po skoszeniu trawnika (zwalczane chwasty powinny wytworzyć odpowiednią powierzchnię liści).

Nie kosić trawnika co najmniej 7 dni po zastosowaniu środka (środek powinien przemieścić się do korzeni chwastów).

Deszcz w ciągu 24 godzin od zabiegu zmniejsza skuteczność działania środka (zmywanie).

Podczas zabiegu nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na rośliny nie przeznaczone do zniszczenia.

Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.

2. Przeciwwskazania:

Nie stosować :

- na liście, pędy i młodą korę roślin nie przeznaczonych do zniszczenia,
- w czasie suszy,
- na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą,
- w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C,

- przed spodziewanym deszczem i przymrozkiem.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Następstwo roślin

Wysiew traw w celu renowacji trawnika nie wcześniej niż 5-6 tygodni od ostatniego zabiegu.

Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

6 godzin

Zaleca się opuścić teren oprysku do momentu, aż środek ochrony roślin nie wyschnie całkowicie na powierzchni liści opryskanych roślin.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczать na paszę w roku stosowania środka.

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIEM:

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Nie zanieczyszczać kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych środkiem ochrony roślin.

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

VII POMOC MEDYCZNA

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –pokaż opakowanie lub etykietę

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682-04-04

Rzeszów - (17) 866-40-25

Kraków - (12) 411-99-99

Sosnowiec - (32) 266-11-45

Lublin - (81) 740-89-83

Tarnów - (14) 631-54-09

Łódź - (42) 657-99-00

Warszawa - (22) 619-66-54

Poznań - (61) 847-69-46

Wrocław - (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -