

Higiena i ochrona zdrowia zwierząt



DEKAMIX[®] dla bydła, trzody chlewnej i drobiu, jest to bardzo skuteczny preparat do suchej dezynfekcji oraz ochrony zdrowia zwierząt.

DEKAMIX[®] służy do dezynfekcji i sanitarizacji budynków inwentarskich w obecności zwierząt hodowlanych.

Stosowanie DEKAMIX[®] powoduje długotrwałe podwyższenie wartości do ok. 11 pH

Optymalne zakresy pH dla chorobotwórczych bakterii	
Staphylococcus aureus:	pH 4,2 – 9,3
Pseudomonas spp. :	pH 5,6 – 8,0
Escherichia coli.:	pH 4,4 – 9,0
Lactobacillus spp.:	pH 3,4 – 7,2
Campylobacter spp.:	pH 4,9 – 9,0
Bacillus cereus.	pH 5,0 – 8,8

DEKAMIX[®] się nie kurzy i nie podrażnia skóry. Jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla zwierząt oraz ludzi. Skutecznie zwalcza chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi w teście DLG.

DEKAMIX[®] • skutecznie zwalcza bakterie, wirusy i grzyby - mniej chorób i infekcji **Mortellaro, Panaritium i bakterie zanokcicy**

- osusza dezynfekowane powierzchnie - zmniejszone zużycie słomy
- zmniejsza stężenie amoniaku - poprawa mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich
- lepsze wykorzystanie pasz - wyższe przyrostyienne
- jednorodna i płynna gnojówka
- nietoksyczny dla ludzi i zwierząt, może być stosowany w obecności zwierząt
- zmniejszone nakłady na pielęgnację

Zalecenia stosowanej ilości DEKAMIX[®] dla bydła

	Stosowanie:	Niezbędna ilość
wybieg krów		
Podłoga szczelinowa	2 - 3 x w tygodniu	100 - 300 g/m ²
Obszar spoczynku krów		
Zagroda podłogowa	2 - 3 x w tygodniu	200 - 300 g/m ²
Zagroda piętrowa	2 - 3 x w tygodniu	200 - 400 g/m ²
Zagroda porodowa /zwierząt chorych		
Podłoga	po wyrzuceniu obornika	200 - 300 g/m ²
Materac gnojowy	przed ponownym wysypaniem 1 x w tygodniu	200 - 300 g/m ²
Zagroda podłogowa (bydło i owce)		
Podłoga	po wyrzuceniu obornika	200 - 300 g/m ²
Materac gnojowy	przed ponownym wysypaniem 1 x w tygodniu	200 - 300 g/m ²

Skutecznie zwalcza bakterie wywołujące **Mastitis**. Poprawia zdrowotność wymion oraz strzyków mając bezpośredni wpływ na obniżenie ilości komórek somatycznych – lepsza jakość mleka.

Zalecenia stosowanej ilości DEKAMIX[®] dla trzody chlewnej i drobiu

	Stosowanie:	Niezbędna ilość
Świnie i drób		
Maciory, prosiaki i tuczniki	na podłodze według potrzeb	100 - 200 g/m ²
Nioski, indyki, kurczaki, tuczniki	po wyrzuceniu obornika	200 - 300 g/m ²

DEKAMIX[®] dzięki zdolności absorbowania mocznika wydalanego przez zwierzęta, nie dopuszcza do jego przekształcenia się w amoniak, utrzymując prawidłowy klimat w budynkach inwentarskich.

Dostępne opakowania: 20kg, 1000kg